

Bibliographie

- Apège (1985), 'Carte des sensibilités de Haute-Savoie, feuille de Cluses', Ministère de l'Environnement, Paris.
- Archiloque, A., Borel, L. et Molinier, R. (1969), 'Feuille de Moustiers-Sainte-Marie', SIGMA communication No 184, Extrait de Documents pour la carte de la végétation des Alpes, 7, pp. 108-144.
- Archiloque, A., Borel, L., Devaux, J.-P., Lavagne, A., Moutte, P. et Weiss, H. (1970), 'Vers une caractérisation phytosociologique de la série méditerranéenne du chêne pubescent', Ann. faculté des Sciences, Marseille, 44, pp. 17-42.
- Aubert, G. et Loisel, R. (1971), 'Contribution à l'étude des groupements des Isoeto-Nanojuncetea et des Helianthemetea annua dans le sud-est méditerranéen français', Ann. Univ. de Provence, Sciences, 45, pp. 203-241.
- Augier, H. (1982), Inventaire et classification des biocénoses marines benthiques de la Méditerranée, Conseil de l'Europe, Strasbourg.
- Augier, H. (1985), Les zones marines protégées, Conseil de l'Europe, Strasbourg.
- Bannerman, D. A. (1963), Birds of the Atlantic Islands, Vol. 1, Oliver and Boyd, Edinburgh and London.
- Barbero, M. (1970), 'A propos des hêtraies des Alpes maritimes et ligures', Ann. Faculté des Sciences, Marseille, 44, pp. 43-78.
- Barbero, M., Gruber, M. et Loisel, R. (1971), 'Les forêts caducifoliées de l'étage collinéen de Provence, des Alpes Maritimes et de la Ligurie occidentale', Ann. Univ. de Provence, 45, pp. 157-202.
- Barbero, M., Loisel, R. et Quézel, P. (1982), 'Les pelouses calcariques du sud-est de la France: facteurs de pression et problèmes de protection', Colloques phytosociologiques, II, pp. 185-193.
- Barkman, J. J. (1958), 'La structure du Rosmarinetum-Lithospermetum helianthemetosum en Bas-Languedoc', SIGMA communication No 148, Blumea, Suppl. 4 (H. J. Lam Jubilee vol.).
- Barkman, J. J. (1973), 'Le *Vio/ion caninae* existe-t-il?', Colloques phytosociologiques, 2, pp. 149-156.
- Barkman, J. J. (1974), 'Le *Dicrano-Quercetum*, nouvelle association des chênaies acidophiles aux Pays-Bas', Colloques phytosociologiques, pp. 251-260.
- Baudière, A. (1974a), 'Les hêtraies acidiphiles des monts de l'Espinouze (Cévennes occidentales), composition floristique et relations avec les chênaies caducifoliées', Colloques phytosociologiques, 3, pp. 1-16.
- Baudière, A. (1974b), 'Contribution à l'étude structurale des forêts des Pyrénées orientales: hêtraies et chênaies acidiphiles', Colloques phytosociologiques, 3, pp. 17-44.
- Baudière, A., Sénégas, J. et Mahoux, B. (eds) (1988), A la découverte de la flore du Haut-Languedoc montagnard, Parc Naturel Régional de Haut-Languedoc, Saint-Pons.
- Becker, M., Picard, J.-F. et Timbal, J. (1981), Laforêt, Masson and Réalisations Editoriales Pédagogiques, Paris.
- Becker, M., Picard, J.-F. et Timbal, J. (1982), Larousse des arbres, des arbustes et des arbrisseaux de l'Europe occidentale, Larousse, Paris.
- Bellot Rodriguez, F. (1979), El tapiz vegetal de la peninsula Ibérica, H. Blume, Madrid. 199.
- Bernard, C. et Fabre, G. (1983), 'Neuvième session extraordinaire SBCO : Causses. Présentation des régions visitées lors de la neuvième session extraordinaire: les Grands Causses cévenols, Lézou et massif de l'Aigoual', Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, NS 14, pp. 57-78.
- Berset, J. (1969), 'Pâturages, prairies et marais montagnards et subalpains des préalpes fribourgeoises', SIGMA communication No 183, Editions Universitaires Fribourg/Suisse, pp. 1-55.
- Bobbink, R. et Willems, J. H. (1987), 'Increasing dominance of *Brachypodium pinnatum* L. Beauv. in chalk grasslands; a threat to a species-rich ecosystem', Biological conservation, 40, pp. 301-314.
- Botineau, M. et Chastagnol, R. (1983), 'Compte-rendu de la sortie botanique du 13 juin 1982 : vallée de la Vienne près de Masléon (CI 87/97), vallée de la Maulde près de Bujaleuf (Haute Vienne) (C197)', Bull. Soc. Bot. du Centre-Ouest, NS 14, pp. 165-173.
- Bournérias, M. (1979), Guide des groupements végétaux de la région parisienne, Sedes, Paris.
- Bournérias, M. (1984), Guide des groupements végétaux de la région parisienne, troisième édition, Sedes, Masson,
- Bournérias, M., Delpech, R., Dorigny, A., Géhu, J. M., Lecointe, A., Maucorps, J., Provost, M. Solau, J. L. Tombal, P. et Wattez, J. R. (1976), 'Les groupements de prairies et leurs satellites dans la vallée inondable de l'Oise (Département de l'Aisne, France)', Colloques phytosociologiques, 5, pp. 89-140.
- Bouzillé, J.-B. (1983), 'Neuvième session extraordinaire SBCO : Causses. Quatrième journée: jeudi 8 juillet: Causse Méjean sud et gorge du Tarn', Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, NS 14, pp. 109-121.
- Braque, R. (1979), 'Réflexions sur la classification des groupements végétaux sylvatiques d'Europe occidentale', Documents phytosociologiques, NS 4, pp. 111-119.
- Brasseur, F., De Sloover, J. R., Devillez, F., Goossens, M., Iserentant, R., Jouret, M. F. et Lebrun, J.

(1977), *La végétation de la réserve naturelle domaniale des étangs de Luchy*, Brussels, Administration des Eaux et Forêts, Service de la Conservation de la Nature, Travaux No 8, pp. 1-61.

Brasseur, F., De Sloover, J. R., Devillez, F., Dumont, J.-M., Goossens, M., Iserentant, R., Jouret, M. F. et Lebrun, J. (1978), *La végétation de la réserve naturelle domaniale des Anciennes Troufferies (Libin)*, Brussels, Min. de l'Agriculture, Administration des Eaux et Forêts, Service de la Conservation de la Nature, Travaux No 9.

Braun-Blanquet, J. (1953), 'Essai sur la végétation du Mont Lozère comparée à celle de l'Aigoual', SIGMA communication No 127, Bulletin de la Société Botanique de France, 100, pp. 1-14.

Braun-Blanquet, J. (1954), 'La végétation alpine et nivale des Alpes françaises', SIGMA communication No 125, Bulletin de la Société Botanique de France, 100, pp. 1-14, Club Alpin Français et 8e Congrès International de Botanique, Paris- Nice, 1954, pp. 1- 72.

Braun-Blanquet, J.: (1955a), 'Das Sedo-Scleranthion neu für die Westalpen', SIGMA communication No 130, Osterreichische Botanische Zeitschrift, 102, pp. 476-482.

Braun-Blanquet, J. (1955b), 'La forêt de Pinus salzmanni de Saint-Guilhem-le-Désert', SIGMA communication No 133, Collectanea Botanica Barcelona, 4, pp. 435-489.

Braun-Blanquet, J. (1961), 'La végétation des vallées sèches à l'intérieur des Alpes et son origine', Résumé du livre Die inneralpine Trockenvegetation von der Provence bis zur Steiermark, Ceobotanica selecta, Vol. 1., Stuttgart, SIGMA communication No 156.

Braun-Blanquet, J. (1967a), 'Vegetationsskizzen aus dem Baskenland mit Ausblicken auf das weitere Ibero-Atlantikum, 2', SIGMA communication No 174, pp. 1-126.

Braun-Blanquet, J. (1967b), 'Une association boréo-arctique nouvelle pour les Alpes françaises, le Kobresietum simpliciusculae', SIGMA communication No 175, Contr. Bot. Cluj, 4, pp. 48-52.

Braun-Blanquet, J. (1967c), 'La chénaie acidophile ibéro-atlantique (Quercion occidentale) en Sologne', SIGMA communication No 173, pp. 53-87.

Braun-Blanquet, J. (1969a), 'Die Pflanzengesellschaften der rätischen Alpen im Rahmen ihrer Gesamtverbreitung, 1 " SIGMA communication No 185.

Braun-Blanquet, J. (1969b), 'Une association endémique des Alpes sud-occidentales, le Myrrhido-Adenostyletum', SIGMA communication No 181, Acta Botanica Croatica, 28, pp. 49-54.

Braun-Blanquet, J. (1970), 'La végétation sylvicole des Causses méridionaux', SIGMA communication No 186.

Braun-Blanquet, J. (1971a), 'Übersicht der Pflanzengesellschaften der rätischen Alpen im Rahmen ihrer Gesamtverbreitung', 3, Flachmoorgesellschaften (Scheuchzerio-Caricetea fuscae), SIGMA communication No 190.

Braun-Blanquet, J. et G. (1971b), 'Les pelouses steppiques des Causses méridionaux', SIGMA communication No 192. Vegetatio Acta Ceobotanica, 22, pp. 201-247.

Braun-Blanquet, J. (1972a), 'Die Gansfußweiden der Alpen (Chenopodium subalpinum)', SIGMA communication No 199, Saussurea, 3, pp. 141-156.

Braun-Blanquet, J. (1972b), 'L'alliance du Festucion spadiceae des Alpes sud-occidentales', SIGMA communication No 205, Bull. Soc. bot. Fr., 119, pp. 591-602.

Braun-Blanquet, J. (1973a), 'Fragmenta phytosociologica mediterranea 1 " SIGMA communication No 194, Vegetatio, 27, pp. 101-113.

Braun-Blanquet, J. (1973b), 'Ein Schmuck der Alpengewässer, die Weidenröschen-Gesellschaft (Epilobion fleischeri)', SIGMA communication No 200, Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae, 19, pp. 47-53.

Braun-Blanquet, J. (1974), 'Fragmenta phytosociologica mediterranea 2. La végétation des landes calcifuges à cistes de la plaine languedocienne', SIGMA communication No 211, Revue de biologie et d'écologie méditerranéenne, 1, pp. 53-62.

Braun-Blanquet, J. (1975a), 'Fragmenta phytosociologica raetica 1 und 2', SIGMA communications Nos 195 and 196, Chur, Buch- und Offsetdruck Bischofberger AG, pp. 42-87.

Braun-Blanquet, J. (1975b), 'Fragmenta phytosociologica raetica 6. Agropyro-Alnetum incanae', SIGMA communication No 208, Beitr. naturk. Forsch. Südw.-Dtl., 34, pp. 25-36.

Braun-Blanquet, J. (1975c), 'L'association à Berardia lanuginosa', SIGMA communication No 213, Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 32, pp. 1005-1006.

Braun-Blanquet, J. (1976), 'Fragmenta phytosociologica raetica 3,4 und 7', SIGMA communications

Nos 201, 207 and 209, Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Techn. Hochschule, Stiftung Rübel in Zürich, 58, pp. 1-49.

Braun-Blanquet, J. (1978a), 'Die Que11flur-Gesellschaft des Cratoneuro-Arabitetum bellidifoliae (Koch 1978) in der subalpinen Stufe Graubündens', SIGMA communication No 119, Vegetatio, 36, pp. 115-117.

Braun-Blanquet, J. (1978b), 'Fragmenta phytosociologica mediterranea 3. Classe Chenopodietea Br.-Bl. 1962, (première partie)', SIGMA communication No 220, Documents phytosociologiques, NS 2, pp. 37-41.

Braun-Blanquet, J., Wikus, E., Sut ter, R. et Braun-Blanquet, G. (1958), 'Lagunenverlandung und Vegetationsentwicklung an der französischen Mittelmeerküste bei Palavas, ein Sukzessions-experiment' SIGMA communication No 141, Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes Rübel in Zürich, 33 pp. 11-32.

Breton, R. (1973), 'Recherches phytosociologiques dans la région de Dijon', SIGMA communication No 196, pp. 1-175.

Brullo, S. (1985), 'Sur la syntaxonomie des pelouses thérophytiques des territoires steppiques de l'Europe sud-occidentale', Documents phytosociologiques, NS 9, pp. 1-24.

Bugnon, F. et Rameau, J.-C. (1974), 'Les forêts acidophiles du Morvan', Colloques phytosociologiques, 3, pp. 45-52.

Campbell, A.-C. (1976), *The seashore and shallow seas of Britain and Europe*, Hamlyn, London.

Carbiener, R. (1970), 'Un exemple de type forestier exceptionnel pour l'Europe occidentale: la forêt du lit majeur du Rhin au niveau du fossé rhénan (*Fraxino-Ulmetum* Oberd 53). Intérêt écologique et biogéographique. Comparaison à d'autres forêts thermohygrophiles', *Vegetatio*, 20, pp. 97-148.

Carbiener, R. (1983), 'Le grand Ried central d'Alsace: Ecologie et évolution d'une zone humide d'origine fluviale rhénane', *Bull. Ecol.*, 14, pp. 249-277.

Caron, B. et Géhu, J.-M. (1976), 'Sur la chênaie pédonculée-frênaie à jacinthe de la forêt de Boulogne-sur-Mer', *Documents phytosociologiques*, 19-20, pp. 99-103.

Chas, E. (1989), 'Cartographie des orchidées des Hautes-Alpes', *L'Orchidophile*, 90, Suppl. 1-48.

Chastagnol, R. et Vilks, A. (1982), 'Compte-rendu de la sortie du 17 mai 1981 dans les gorges de l'Auvezire (Dordogne)', *Bull. Soc. Bot. du Centre-Ouest*, NS 13, pp. 59-63.

Chastagnol, R., Contré, E., Fredon, 1.-1. et Vilks, A. (1978), 'Compte-rendu de la cinquième session extraordinaire de la société botanique du Centre-Ouest. Région de Saint-Junien (Haute-Vienne), 18-22 juillet 1978', *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, NS 9, pp. 13-99.

Clément, B., Gloaguen, J.-C. et Touffet, J. (1974), 'Contribution à l'étude phytosociologique des forêts de Bretagne', *Coll. phytosoc.*, 3, pp. 53-87.

Coquillard, P., Guillot, J. et Gueugnot, J. (1985), 'A propos de la dynamique des hêtraies de basse altitude sur le rebord oriental du plateau de la chaîne des Puys. Exemple du bassin versant du Lac d'Aydat (Puy-de-Dôme)', *Rev. Sc. Nat. d'Auvergne*, pp. 9-23.

Coûteaux, M. (1969), 'Recherches écologiques sur les forêts de Gaume. 1. Etude des régions d'Etalle, de Châtillon et de Villers-devant-Orval et essai de classification des forêts installées sur substrat triaso-liasique', *Bull. lard. Bot. Nat. de Belg.*, 39, pp. 227-311, 313-343.

Dandy, J. E. (1980), 'Genus *Halophila*' in: Tutin et al. (eds), *Flora Europaea*, Vol. 5, p. 5, Cambridge University Press.

De Foucault, B. (1976), 'Données pour le *Trollio-Molinetum coeruleae* Guin. 1955 en Jura Français', *Colloques phytosociologiques*, 5, pp. 245-258.

Dejou, J. (1985), 'Les sols de la région de Clermont-Ferrand', *Rev. Sc. Nat. d'Auvergne*, 51, pp. 25-35.

Delelis-Dusollier, A. et Géhu, J.-M. (1974), 'Apport à la phytosociologie de quelques forêts thermo-acidiphiles ligériennes et de leurs stades d'altération', *Colloques phytosociologiques*, 3, pp. 141-159.

Delpéch, R. (1976), 'Affinités phytosociologiques de quelques prairies alluviales inondables de Sologne' *Colloques phytosociologiques*, 5, pp. 57-64.

Delpéch, R. et Frileux, P.-N. (1976), 'Aperçu phytosociologique sur les prairies hygrophiles', *Colloques phytosociologiques*, 5, pp. 51-56.

Delvosalle, L. (1953), 'Aspects végétaux de la Corse', *Nat. Belges*, 34, pp. 234-248.

Delvosalle, L. (1977), 'L'herborisation générale de la Société royale de Botanique de Belgique dans le Jura franco-suisse, en juillet 1976', *Bull. Soc. royale Bot. Belg.*, 110, pp. 3-11.

Delvosalle, L., Demaret, F., Lambinon, J. et Lawalrée, A. (1969), *Plantes rares, disparues ou menacées de disparition en Belgique: L'appauvrissement de la flore indigène*, Brussels, Ministère de l'Agriculture, Administration des Eaux et Forêts, Service des Réserves Naturelles Domaniales et de la Conservation de la Nature, Travaux No 4.

Dendaletche, C. (1973), *Guide du naturaliste dans les Pyrénées occidentales*, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.

Depasse, S., Duvigneaud, J. et De Zuttere, Ph. (1970), 'Le site de la Mer de Sable à Stamburges (province de Hainaut, Belgique)', *Lejeunia*, NS 54, pp. 1-36.

Deschatres, R. (1983), 'Neuvième session extraordinaire SBCO : Causses. Sixième journée: samedi 10 juillet: Causse de Séverac et Lézou', *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS 14, pp. 133-140.

De Sloover, J. (1970), 'Les peuplements de *Cladium mariscus* du district côtier belge', *Lejeunia*, 51, pp. 1-24.

De Sloover, J. R., Dumont, J. M., Gillard, V., Iserentant, R. et Lebrun, J. (1980), *La réserve naturelle domaniale des prés de la Liègne (Lierneux)*, Brussels, Ministère de l'Agriculture, Administration des Eaux et Forêts, Service de la Conservation de la Nature, Travaux No 12.

De Sloover, J., Dumont, J.-M., Goossens, M. et Lebrun, J. (1978), 'Les landes tourbeuses du plateau des Tailles', *Colloques phytosociologiques*, 7, pp. 11-133.

De Sloover, J. et Lebrun, J. (1976), 'Les mégaphorbiaies à angélique (*Angelica sylvestris* L.) au plateau des Tailles (Ardenne belge)', *Colloques phytosociologiques*, 5, pp. 1-8.

De Sloover, J. et Lebrun, J. (1984), 'Les terrasses fleuries de l'Oesling (Ardenne sud-orientale)', *Lejeunia*, NS

Dethioux, M. (1969), 'La hêtraie à mélisse et aspérule des districts mosan et ardennais', *Bull. Rech. Agr. Gembloux*, 4, pp. 471-483.

Dethioux, M. (1978), 'Les chênaies à charme et luzule blanche de l'Ardenne belge', *Bull. Rech. Agr. Gembloux*, 13, pp. 41-48.

Dethioux, M. (1980), 'Les glycérades ripicoles de Belgique', *Natura Mosana*, 33, pp. 128-138.

Dethioux, M. (1981), 'Les reliques du *Phragmites* en Belgique', *Colloques phytosociologiques*, 10, pp. 351-368.

Dethioux, M. (1982), 'Les cariçaies du bord des eaux', *Communication du Centre d'Ecologie forestière et rurale*, NS 34, pp. 1-21.

Dethioux, M., Limbourg, P. et Noifalisse, A. (1983), 'Répertoire écologique des espèces herbagères de Belgique', *Communication du Centre d'Ecologie forestière et rurale (IRS1A)*, NS 37, pp. 1-29.

Dickinson, G. et Randall, R. E. (1979), 'An interpretation of machair vegetation', *Proc. Royal Soc. of Edinburgh*, 77, pp. 267-278.

Dierschke, H. (1980), 'Zur syntaxonomischen Stellung und Gliederung der Ufer- und Auenwälder Südeuropas', *Colloques phytosociologiques*, 9, pp. 115-129.

- Dierssen, K. (1978), 'Some aspects of the classification of oligotrophic and mesotrophic mire communities in Europe', *Colloques phytosociologiques*, 7, pp. 399-423.
- Dijkema, K. S., Beeftink, W. G., Doody, J. P., Géhu, J.-M., Heydemann, B. et Rivas-Martinez, S. (1984), *La végétation halophile en Europe (prés salés)*, Conseil de l'Europe, Strasbourg.
- Donker, M. et Stevelink, A. (1962), 'Einige Wiesenvegetationen (Gaudinieta-Arrhenatheretum ; Molinietum mediterraneum ; Caricetum divisa) im Vistre- Tal bei le Cailar', *SIGMA communication No 152. Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen, Nederland*, 61, pp. 1-32.
- Dricot, E.-M. (1960), 'Recherches palynologiques sur le plateau des Hautes-Fagnes', *Bull. Soc. Royale de Bot. de Belgique*, 92, pp. 157-195.
- Dumont, J.-M. (1974), 'Les anciens taillis à écorce de la région du plateau des Tailles (Haute Ardenne belge)', *Colloques phytosociologiques*, 3, pp. 89-106.
- Dupias, G. (1966), 'Carte de la végétation de la France. No 65 : Rodez', *Centre national de la recherche scientifique, Toulouse*.
- Dupias, G. (1985), 'Végétation des Pyrénées. Carte de la végétation de la France au 200 000e. Notice détaillée de la partie pyrénéenne des feuilles 69 : Bayonne; 70 : Tarbes; 71 : Toulouse; 72 : Carcassonne; 76 : Luz .77 : Foix Perpignan', *Centre national de la recherche scientifique, Paris*.
- Durin, L., Mullenders, W. et Vanden Berghen, C. (1964), 'Les forêts à Buxus des bassins de la Meuse française et de la Haute-Marne', *Bull. Soc. Royale Bot. Belg.*, 98, pp. 77-100.
- Durin, L., Géhu, J.-M., Noirfalise, A. et Sougnez, N. (1967), 'Les hêtraies atlantiques et leur essaim climatique dans le nord-ouest et l'ouest de la France', *Bull. Soc. Bot. de France, NS 20*, pp. 59-89.
- Duvigneaud, J. (1961), 'La végétation de l'Entre-Sambre-et-Meuse, la hêtraie des sols calcaires', *Bull. Soc. Royale Bot. Belg.*, 93, pp. 161-174.
- Duvigneaud, J. (1967), 'Flore et végétation halophiles de la Lorraine orientale', *Mém. Soc. Roy. Bot. de Belgique*, 3, pp. 1-122.
- Duvigneaud, J. (1972), 'La flore et la végétation des rives d'étangs dans la partie occidentale de l'Entre-Sambre-et-Meuse', *Nat. Belges*, 53, pp. 2-18.
- Duvigneaud, J. (1974), 'Les chênaies acidiphiles de la région liégeoise, (Belgique). Les causes de leur dégradation, leurs possibilités d'évolution', *Colloques phytosociologiques*, 3, pp. 107-113.
- Duvigneaud, J. (1975), 'Les prés salés de la rive gauche de l'Escaut', *Colloques phytosociologiques*, 4, pp.271-275.
- Duvigneaud, J. (1976), 'Itinéraire de l'excursion post-colloque', *Colloques phytosociologiques*, 5, pp. 363-372.
- Duvigneaud, J. (1982a), 'Le pré à Bromus erectus et Thalictrum minus subsp. majus de la plaine alluviale de la Moselle (Lorraine, France). Un groupement du Mesobromion en voie de raréfaction et de disparition', *Colloques phytosociologiques*, II, pp. 269-280.
- Duvigneaud, J. (1982b), 'Les pelouses calcaires de la partie septentrionale de la Champagne crayeuse (Département des Ardennes, France). Un exemple d'appauvrissement écologique et floristique', *Colloques phytosociologiques*, II, pp. 282-296.
- Duvigneaud, J. (1982c), 'Les pelouses xériques colonisant les falaises calcaires des vallées de l'Ourthe et de l'Ambève (province de Liège, Belgique), leur importance floristique et phytogéographique', *Colloques phytosociologiques*, 11, pp. 297-309.
- Duvigneaud, J. (1982d), 'La halde calaminaire du Rocheux à Theux', *Parcs Nationaux*, 37, pp. 119-138.
- Duvigneaud, J. (1983a), 'La côte de Moselle dans la région d'Ars-sur-Moselle. Actes du colloque "Inventaires et gestion des milieux naturels" " Institut Européen d'Ecologie, Metz.
- Duvigneaud, J. (1983b), 'La gestion des pelouses calcaires. Actes du colloque "Inventaires et gestion des milieux naturels" " Institut Européen d'Ecologie, Metz.
- Duvigneaud, J. (1986), 'La gestion écologique et traditionnelle de nos étangs: pour la coexistence des deux écosystèmes "étang" et "étang mis en assec"', *Nat. Belges*, 67, pp. 65-94.
- Duvigneaud, J. et Mullenders, W. (1962), 'La végétation forestière des côtes Lorraines: la forêt du Mont-Dieu (Département des Ardennes, France)', *Bull. Soc. Royale Bot. Belg.*, 94, pp. 91-130.
- Duvigneaud, J. et Saintenoy-Simon, J. (1988), 'La Heid des Gattes à Sougné-Remouchamps (Aywaille)', *Parcs Nationaux*, 43, pp. 108-126.
- Duvigneaud, J., Sotiaux, A. et Sotiaux, O. (1986), 'Végétation et flore d'un étang ardennais mis en assec : l'étang de La Motte à Signy-le-Petit (Département des Ardennes, France)', *Bull. Soc. Royale Bot. Belg.*, 49, pp. 35-46.
- Duvigneaud, P. (1947), 'Remarques sur la végétation des pannes dans les dunes littorales entre La Panne et Dunkerque', *Bull. Soc. Royale Bot. de Belgique*, 29, pp. 123-140.
- Duvigneaud, P. (1953), 'Les groupements végétaux de la France méditerranéenne', *Nat. Belges*, 34, pp. 205-233.
- Duvigneaud, P. (1980), *La synthèse écologique, seconde édition*, Doin, Paris.
- Duvigneaud, P. et Denayer-De Sillet, S. (1970), 'Biomasse, productivité et phytogéochimie de la végétation riveraine d'un ruisseau ardennais. 1. Aperçu sur les sols, la végétation et la biomasse de la strate au sol', *Bull. Soc. Royale Bot. Belg.*, 103, pp. 355-382.
- Ellenberg, H. (1963), *Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen*, Eugen Ulmer, Stuttgart.
- Ellenberg, H. (1988), *Vegetation ecology of Central Europe*, quatrième édition, Cambridge University Press.
- Fenaroli, L. (1985), *Cuida allafiora mediterranea*, Giunti Martello, Florence.
- Fequant, G. (1980), 'Sortie du 18 mai 1980. Etude de quelques écosystèmes de la vallée de l'Aisne moyenne et modèle périglaciaire en Champagne', *Bull. Lorr.Hist. Nat. Ardennes*, 70, pp. II-14.
- Fiala-Médioni, A., Petron, C. et Rives, C. (1987), *Guide sous-marin de la Méditerranée*, Flammarion, Paris.

- Flint, R. F. (1971), *Glacial and quaternary geology*, John Wiley and Sons, New York, London, Toronto, Sydney.
- Frileux, P.-N. (1974), 'Contribution à l'étude des forêts acidiphiles de Haute-Normandie', *Colloques phytosociologiques*, 3, pp. 287-300.
- Frileux, P.-N. (1976), 'Aperçu phytosociologique sur les prairies hygrophiles du Pays de Bray (Seine-Maritime et Oise -France)', *Colloques phytosociologiques*, 5, pp. 303-319.
- Froment, A. (1972), 'Evolution récente du couvert végétal des Hautes Fagnes de la Baraque Michel', *Nat. Belges*, 52, pp. 49- 78.
- Gamisans, J. (1985), *Catalogue des plantes vasculaires de la Corse*, Ajaccio, Parc naturel régional de la Corse.
- Gamisans, J. (1991), 'La végétation de la Corse' in: Jeanmonod, D. et Burdet, H. M. (eds), *Compléments au prodrome de la flore corse*, Conservatoire et Jardin botaniques, Ville de Genève.
- Gaussen, H. (1964), 'Carte de la végétation de la France, No 77 : Foix', Toulouse, Centre national de la recherche scientifique.
- Gaussen, H. (1974), 'Carte de la végétation de la France, No 72: Carcassonne', Toulouse, Centre national de la recherche scientifique.
- Géhu, J.-M. (1973), 'Essai pour un système de classification phytosociologique des landes atlantiques françaises', *Colloques phytosociologiques*, 2, pp. 361-372.
- Géhu, J.-M. (1984), 'Classification des écosystèmes d'Europe', *Conseil de l'Europe, Doc. SN-VS (84) 3*.
- Géhu, J.-M. (1985), 'La végétation des dunes et bordures des plages européennes', *Collection sauvegarde de la nature 32*, Conseil de l'Europe, Strasbourg.
- Géhu, J.-M. (1986), 'La végétation côtière, faits de géosynvicariance atlantico-méditerranéenne', *Bull. Ecol.*, 17, pp. 179-187.
- Géhu, J.-M., Caron, B. et Bon, M. (1975), 'Données sur la végétation des près salés de la Baie de Somme', *Colloques phytosociologiques*, 4, pp. 197-225.
- Géhu, J.-M. et de Foucault, B. (1977), 'Les pelouses siliceuses à thérophytes de la zone littorale du nord de la France', *Colloques phytosociologiques*, 6, pp. 319-322.
- Géhu, J.-M., de Foucault, B. et Géhu-Franck, J. (1978), 'Les végétations à *Arthrocnemum /ruticosum* du littoral atlantique français', *Bull. Soc. bot. du nord de la France*, 30, pp. 83-87.
- Géhu, J.-M., Franck, J. et Scoppola, A. (1984), 'Observations sur la végétation aérohaline des falaises maritimes du centre ouest français', *Documents phytosociologiques*, NS 8, pp. 147-114.
- Géhu, J.-M. et Géhu, J. (1976), 'Les groupements à *Angelica heterocarpa* des estuaires atlantiques français', *Colloques phytosociologiques*, 5, pp. 359-362.
- Géhu, J.-M. et Géhu-Franck, J. (1984a), 'Schéma synsystématique et synchorologique des végétations phanérogamiques halophiles françaises', *Documents phytosociologiques*, NS 8, pp. 51- 70.
- Géhu, J.-M. et Géhu-Franck, J. (1984b), 'Sur quelques groupements chasmophytiques littoraux nord-atlantiques et pour un nouveau schéma synsystématique des végétations xérohalines des falaises atlantiques', *Documents phytosociologiques*, NS 8, pp. 127-146.
- Géhu, J.-M. et Géhu-Franck, J. (1984c), 'Sur les forêts sclérophylles de chêne et de pin maritime des dunes atlantiques françaises', *Documents phytosociologiques*, NS 8, pp. 219-231.
- Géhu, J.-M. et Géhu-Franck, J. (1985), 'L'ormie littorale thermo-atlantique de l'ouest français', *Documents phytosociologiques*, NS 9, pp. 401-408.
- Géhu, J.-M. et Mériaux, J. L. (1983), 'Distribution et caractères phytosociologiques des renoncules aquatiques du sous-genre *Batrachium* dans le Nord de la France', *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 130, *Lettres bot.*, pp. 57 -67.
- Géhu, J.-M. et Rivaz-Martinez, S. (1984), 'Classification des communautés halophiles européennes', in : Dijkema et al., *La végétation halophile en Europe*, Conseil de l'Europe, Strasbourg.
- Géhu, J.-M. et Tüxen, R. (1971), 'Essai de synthèse phytosociologique des dunes atlantiques européennes', *Colloques phytosociologiques*, 1, pp. 61-77.
- Gésan, M. et Plat, P. (1983), 'Sortie botanique à Brigueille Chantre (Vienne), 20 juin 1982', *Bull. Soc. Bot. du Centre-Ouest*, NS 14, pp. 174-180.
- Gimingham, C. H. (1972), *Ecology o/heathlands*, Chapman and Hall, London.
- Gimingham C. H., Chapman, S. B. et Webb, N. R. (1979), 'European heathlands' in: Specht, R. L. (ed.), *Ecosystems o/the world 9A. Heathlands and related shrublands*, Elsevier, Amsterdam.
- Girerd, B. (1978), 'Inventaire écologique et biogéographique de la flore du département de Vaucluse. Avignon', *Société d'Etude des Sciences Naturelles de Vaucluse*.
- Gruber, M. (1978), *La végétation des Pyrénées ariégeoises et catalanes occidentales*, Thèse, Université Aix -Marseille III.
- Gruber, M. (1988), 'Les bois mixtes à *Carpinus betulus* L. des Hautes-Pyrénées', *Bull. Soc. Rist. Nat. Toulouse*, 124, pp. 35-41.
- Guéry, R. (1983), 'Neuvième session extraordinaire SBCO : Causses. Cinquième journée: vendredi 9 juillet: Le Causse Noir', *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS 14, pp. 123-132.
- Guillot, J. (1983), 'Neuvième session extraordinaire SBCO : Causses. Première journée : lundi 5 juillet : Larzac occidental, central et oriental', *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS 14, pp. 79-85.
- Guinochet, M. et de Vilmorin, R. (1973), *Flore de France*. 1. CNRS, Paris. Guinochet, M. et de Vilmorin, R. (1978), *Flore de France*. 3. CNRS, Paris. Guittonneau, G. G. et Huon, A. (1983), *Connaître et reconnaître la flore et la végétation méditerranéennes, Ouest-France*, Rennes.
- Harant, H. et Jarry, D. (1983), *Guide du naturaliste dans le Midi de la France*. 1. La mer, le littoral, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.
- Harmelin, J.-G., Vacelet, J. et Petron, C. (1987), *Méditerranée vivante*, Glénat, Grenoble.

Herbaults, J. (1971), 'Flore et végétation des dunes de la Réserve Naturelle Domaniale du Westhoek', Travaux du Service des Réserves Naturelles Domaniales et de la Conservation de la Nature, No 5.

Holmes, N. (1983), *Typing British rivers according to their flora*, NCC.

Horvat, I., Glavac, V. et Ellenberg, H. (1974), *Vegetation Südosteuropas*, Fischer Verlag, Stuttgart.

Hübl, E., Tideman, P. et Barkman, J. J. (1958), 'Das Rosmarinetum-Lithospermetum helianthemetosum vom Bas Languedoc (Südfrankreich)', SIGMA communication No 144, Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, Sonderabdruck-caus Band 97, pp. 110-125.

Ilijanic, L. (1965), 'Recherches phytosociologiques et écologiques dans les prairies de l'Arrhenatherion de Lattes (Hérault)', SIGMA communication No 171, Acta Botanica Croatica, 24, pp. 47-67.

Izard, M., Lascombes, G., Lavergne, D., Leredde, C. et Rey, P. (1963), 'Carte de la végétation de la France, No 56 : Bordeaux', CNRS, Toulouse.

Izard, M., Dupont, P. et Lascombes, G. (1968), 'Carte de la végétation de la France, No 70 : Tarbes', CNRS, Toulouse.

Izco, J. (1977), 'Revision sintética de los pastizales del suborden Bromenalia rubenti-tectori', Colloques phytosociologiques, 6, pp. 37-56.

Izco, J., Fernandez, F. et Molina, A. (1984), 'El orden Tamaricetalia Br.-Bl. y Bolos 1957 y su ampliación con los tarayales hiperhalofilos', Documents phytosociologiques, NS 8, pp. 377-392.

Jacamon, M. (1983), *Arbres et forêts de Lorraine*, Editions SAEP, Ingersheim, Colmar.

Jasiewicz, A. (1963, 1964), 'Observations sur la flore et la végétation des silicates d'Argelliers (Hérault)', SIGMA communication No 163 (1964), Fragmenta Florística et Gzobotanica 9 (1963), pp. 471-493.

Jong, W. W. de (1965), 'Les types d'enracinement des espèces du Juncion maritimi méditerranéen. 1', SIGMA communication No 170, Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen Proc. Ser. C, 68, pp. 175-208.

Kornas, I. (1958-59), 'Succession régressive de la végétation des garrigues sur calcaire compact dans la Montagne de la Gardiole près de Montpellier', SIGMA communication No 145, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 27, pp. 563-595.

Lahondère, C. (1980), 'La flore et la végétation phanérogame des dunes du Centre-Ouest', Documents phytosociologiques, NS 4, pp. 113-172.

Lahondère, C. (1982), 'Huitième session extraordinaire de la Société Botanique du Centre Ouest. Provence occidentale, 14-19 avril 1981. Troisième journée: jeudi 16 avril: la Camargue', Bull. Soc. Bot. Centre Ouest, NS 13, pp. 144-155.

Lahondère, C. (1983), 'Neuvième session extraordinaire de la Société Botanique du Centre Ouest. Causses. Troisième journée: mercredi 7 juillet: Les gorges de la Dourbie, le Causse Noir nord-oriental, le mont Aigoual, les gorges de la lonte', Bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest, NS 14, pp. 96-108.

Lahondère, C., Botté, F., Grelon, I., Bernard, C., Terrisse, I. et Mouline, C. (1985), 'Onzième session extraordinaire: Corse (1984-85)', Bull. Soc. Bot. Centre Ouest, NS 16, pp. 193-264.

Lambinon, I. (1974), 'Le boulonnais et le nord des Bas-Champs Picards (Département du Pas-de-Calais, France). Excursion de la Société Botanique de Liège du 9 au 11 juin 1973', Lejeunia, NS 73, pp. 1-22.

Lambinon, I. et Auquier, P. (1964), 'La flore et la végétation des terrains calaminaires de la Wallonie septentrionale et de la Rhénanie aixoise. Types chorologiques et groupes écologiques', Natura Mosana, 16, pp. 113-130.

Lambinon, I., Duvigneaud, I. et Demoulin, V. (1978), 'Excursion géobotanique en Corse du 11 au 18 juin 1978', syllabus introductif, Université de Liège.

Lapraz, G. (1970), 'Les groupements forestiers et les garrigues du Mont Boron et du Mont Alban (Alpes-maritimes)', Riviera scientifique, 57, pp. 51-64, pp. 74-86.

Lapraz, G. (1973a), 'Les garrigues de dégradation du Quercetum ilicis entre Nice et La Turbie (Calycotomo-Pistacietum)', Riviera scientifique, 60, pp. 2-16.

Lapraz, G. (1973b), 'Les groupements à romarin et Fumana de la région niçoise (Fumano-Rosmarinetum)', Riviera scientifique, 60, pp. 57-76.

Lapraz, G. (1974), 'Les vestiges de l'Oleo-Lentiscetum du Cap Ferrat', Riviera scientifique, 61, pp. 81-94.

Lapraz, G. (1975), 'Les forêts méditerranéennes mésophiles à chêne vert, chêne pubescent, Ostrya et Fraxinus ornus de la région niçoise: l'association à Ostrya carpinifolia et Quercus ilex (Ostrya-Quercetum ilicis)', Riviera scientifique, 62, pp. 6-27.

Lapraz, G. (1976), 'Le groupement de basse altitude à Dorycnium suffruticosum et Aphyllanthes monspeliensis de la région niçoise (Daryenio-Aphyllanthes)', Riviera scientifique, 63, pp. 3-20.

Lapraz, G. (1977), 'Note sur l'Oleo-Lentiscetum du littoral de la Côte d'Azur entre Nice et Menton', Riviera scientifique, 64, pp. 29-46.

Lapraz, G. (1978), 'Note sur les pelouses à Tuberaria guttata L. Four. du massif du Terme-Blanc (massif de Biot)', Riviera scientifique, 65, pp. 43-56.

Lapraz, G. (1981), 'Les forêts méso-hygrophiles de basse altitude des ravins et vallées affluents du Var, du Paillon et du Loup: l'association à Melica uniflora et Ostrya carpinifolia {Melico uniflorae-Ostryetum}', Riviera scientifique, 68, pp. 5-20.

Lapraz, G. (1984), 'Le groupement à genêt cendré, lavande vraie et aphyllanthe de Montpellier de l'arrière-pays de Nice et de Menton entre 500 et 1 000 mètres d'altitude {Doryonio-Aphyllanthes linetosum salsoloidis}', Riviera scientifique, 68, pp. 5-20.

Lavagne, A. et Moutte, P. (1971), 'Premières observations chorologiques et phénologiques sur les ripisilves à Nerium oleander (nériaies) en Provence', Ann. Univ. de Provence, Sciences, 45, pp. 135-155.

Lavagne, A. et Moutte, P. (1977), 'Carte phytosociologique de Hyères -Porquerolles au 1/50 000e', Revue de biologie et d'écologie méditerranéenne, No 4 spécial, pp. 147-238.

Lavergne, D. (1963), 'Carte de la végétation de la France, No 57 : Bergerac', CNRS, Toulouse. Lavergne, D. (1969), 'Carte de la végétation de la France, No 51 : Limoges', CNRS, Toulouse. Lebrun, J., Noirfalise, A., Heinemann, P. et Vanden Berghen, C. (1949), 'Les associations végétales de Belgique', Bull. Soc. Royale Bot. Belg., 82, pp. 105-207. Lippert, (1983), Atlas des fleurs des Alpes, Nathan, Paris.

Loisel, R. (1971), 'Contribution à l'étude des cistaies calcifuges de Provence', Ann. Univ. de Provence, Sciences, 46, pp. 63-81.

Malaisse, F. (1963), 'Contribution à l'étude des hêtraies d'Europe occidentale. Note 3 : Remarques préliminaires sur la phénologie des hêtraies', Nat. Belges, 44, pp. 369-382.

Malaisse, F. (1964a), 'Contribution à l'étude des hêtraies d'Europe occidentale. Note 1 : Remarques sur la position phytogéographique de certaines hêtraies provençales', Bull. Soc. Royale Bot. Belg., 97, pp. 27-30.

Malaisse, F. (1964b), 'Contribution à l'étude des hêtraies d'Europe occidentale. Note 2 : Remarques sur la distribution provençale de certaines espèces', Bull. Soc. Royale Bot. Belg., 97, pp. 31-36.

Malaisse, F. (1964c), 'Contribution à l'étude des hêtraies d'Europe occidentale. Note 5 : Bref aperçu sur l'importance phytogéographique du Col du Rousset (1 411 m, Drôme, France)', Bull. Soc. Royale Bot. Belg., 98, pp. 101-104.

Malavoi, J. R. (1989), 'Typologie des faciès d'écoulement ou unités morphodynamiques des cours d'eau à haute énergie', Bull. Fr. Pêche Piscic., 315, pp. 189-210.

Maquino, A., Ramont, J. L. et Petit, J. (1972), 'La halde calaminaire de Schmalgraf', Les Naturalistes Belges, 53, pp. 470-474.

Margot, J. (1983), 'La végétation aquatique des "springputten" en forêt de Meerdael. Evolution et présences floristiques', Nat. Belges, 64, pp. 199-221.

Marlier, G. (1977-78), 'Les insectes aquatiques', Nat. Belges, 58 : pp. 97-110, pp. 166-178, pp. 226-235, pp. 266-280, pp. 295-309; 59, pp. 37-44, pp. 82-98.

Mériaux, J. L. (1976), 'Les groupements à *Epilobium hirsutum* L. et à *Eupatorium cannabinum* L. dans le nord de la France', Colloques phytosociologiques, 5, pp. 340-352.

Mériaux, J. L. (1982), 'L'utilisation des macrophytes et des phytocoenoses aquatiques comme indicateurs de la qualité des eaux', Nat. Belges, 63, pp. 12-28.

Mériaux, M. L., Schumacker, R., Tombal, P. et de Zuttere, P. (1978), 'Contribution à l'étude des boulaies à sphaignes dans le nord de la France, l'Ile de France et les Ardennes', Colloques phytosociologiques, 7, pp. 469-494.

Meson, M. L. (1983), 'Aspectos autoecologicos de *Quercus pyrenaica* Willd. : distribucion y climatologia' Boletín de la Estación Central de Ecología, 12, pp. 25-33.

Mitchell, R. (1987), 'Conservation des biocénoses marines benthiques de la mer du Nord et de la Baltique' Conseil de l'Europe, Strasbourg.

Molinier, R. (1957), 'La végétation du bassin synclinal de La Ciotat-Le Beausset (Var)', Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle de Marseille, 17, pp. 15-71.

Molinier, R., Archiloque, A., Borel, L., Devaux, J.-P., Lavagne, A. et Moutte, P. (1976), 'Carte de la végétation de la France, No 74: Marseille', Centre national de la recherche scientifique, Aix.

Molinier, R. et Martin, P. (1980), Catalogue des plantes vasculaires des Bouches-du-Rhône, Imprimerie municipale, Marseille.

Molinier, R. et Tallon, G. (1970), 'Prodrome des unités phytosociologiques observées en Camargue', SIGMA communication No 188, Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle de Marseille, 30, pp. 5-110.

Mollet, A. M., Francez, A. J., Gillet, F. et Schumacher, R. (1985), 'Contribution à la connaissance des tourbières d'Auvergne, végétation et physico-chimie des sites de Chambédaze et de la Godivelle (Puy-de-Dôme)', Rev. Sc. d'Auvergne, 51, pp. 51-59.

Mouline, C. (1985), 'Onzième session extraordinaire: Corse (1984 et 1985). Sables littoraux et dunes de la côte orientale, bassin calcaire de Saint Florent', Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 16, pp. 247-250.

Mullenders, W. (1955), 'Les étages de végétation dans les Alpes', Nat. Belges, 36, pp. 2-35.

Mullenders, W. et Knop, C. (1962), 'Recherches palynologiques dans les Ardennes belges. 1. La tourbière du Grand Passage', Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique, 94, pp. 163-175.

Muller, S. (1978), 'Note sur la végétation des tourbières vosgiennes, extension altitudinale et relations du *Rhynchosporium albae* Koch 26 et du *Caricetum limosae* Br.-Bl. 21 " Colloques phytosociologiques, 7, pp. 225-230.

Muller, S. (1984), 'Dixième session extraordinaire. Vosges-Alsace. 6-13 juillet 1983. Première journée : 6 juillet 1983. Quelques aspects de la végétation du Pays de Bitche', Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, NS 16, pp. 211-214.

Muller, S. (1985), 'Les phytocénoses d'indigénat du Pin sylvestre (*Pi-₁-s sylvestris* L.) dans le Pays de Bitche (Vosges du Nord)', Comptes Rendus de l'Académie des Sciences 301, série 3, pp. 73-76.

Muller, Y. (1985), L'avifaune forestière nicheuse des Vosges du Nord. Sa place dans le contexte médio-européen, Thèse, Université de Dijon.

Munaut, A. V. et Gilot, E. (1976), 'L'extension subatlantique de *Fagus sylvatica* L. dans le nord de la France', Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique, 109, pp. 231-237.

Nikfeld, H. (1962), 'Über die Pflanzengesellschaften der Fels- und Mauerspaltens Südfankreichs', SIGMA communication No 162.

Noirfalise, A. (1952), 'La frênaie à *Carex*', mémoire No 122. Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Brussels.

Noirfalise, A. (1956), 'La hêtraie ardennaise', Bull. Inst. Agr. et Station de Recherches de Gembloux, 24, pp.208-239.

Noirfalise, A. (1960), 'Les érablières de ravin en Belgique', Bull. lard. Bot. Etat, 30, pp. 37-49.

Noirfalise, A. (1962), 'La hêtraie calcicole et ses taillis de substitution', Bull. Inst. Agr. et Stat. Rech. Gembloux, 30, pp. 332-349.

- Noirfalise, A. (1968), 'Le Carpinion dans l'Ouest de l'Europe', Centre de Cartographie Phytosociologique, Gembloux, communication No 49. Fedes Repertorium, Berlin, 79, pp. 69-85.
- Noirfalise, A. (1969), 'La chênaie mélangée à jacinthe du domaine atlantique de l'Europe (Endymio-Carpinetum)', *Vegetatio*, 17, pp. 131-150.
- Noirfalise, A. (1984), *Forêts et stations forestières en Belgique*, Presses agronomiques de Gembloux, Gembloux.
- Noirfalise, A. (1986), 'Carte des végétations naturelles potentielles des pays membres du Conseil de L'Europe. Texte explicatif, Centre d'écologie forestière et rurale, Gembloux.
- Noirfalise, A. (1987), 'Carte de la végétation naturelle des Etats membres des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe'. 1 : 3 000 000. Deuxième édition, texte explicatif, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg.
- Noirfalise, A. (1988), *Paysages. L'Europe de la diversité*, Commission des Communautés européennes, Luxembourg.
- Noirfalise, A., Dethioux, M. et de Zuttere, P. (1971), 'Les bois de bouleau pubescent en Haute Belgique (Vaccinio-Betuletum pubescentis)', *Bull. Rech. Agron. Gembloux*, 6, pp. 203-214.
- Noirfalise, A. et Dethioux, M. (1972), 'La carte herbagère du grand-duché de Luxembourg', *Annales de Gembloux*, 78, pp. 167-177.
- Noirfalise, A. et Dethioux, M. (1977), 'Synopsis des végétations aquatiques d'eau douce en Belgique', *Communication du Centre d'écologie forestière et rurale, NS 14*, pp. 1-25.
- Noirfalise, A. et Dethioux, M. (1982), 'Les pelouses calcaires de la Belgique et leur protection', *Colloques phytosociologiques, II*, pp. 202-218.
- Noirfalise, A. et Roisin, M. A. (1981), 'La hêtraie à millet étalé en Belgique (Milio-Fagetum)', *Bull. Rech. Agron. Gembloux*, 16, pp. 249-256.
- Noirfalise, A. et Sougnez, N. (1956), 'Les chênaies de l'Ardenne verviétoise', *Pédologie*, 6, pp. 119-143.
- Noirfalise, A. et Sougnez, N. (1961), 'Les forêts riveraines de Belgique', *Bull. Jard. Bot. Etat*, 31, pp. 199-287.
- Noirfalise, A. et Sougnez, N. (1963), 'Les forêts du bassin de Mons', *Pédologie*, 13, pp. 200-215.
- Noirfalise, A., Stieperaere, H. et Vanhecke, L. (1980), 'Carte d'évaluation biologique de la Belgique. Liste des unités cartographiques', Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, Brussels.
- Noirfalise, A., Stieperaere, H. et Vanhecke, L. (1985), 'Liste des unités cartographiques' in: De Blust et al. (eds) (1985), *Carte d'évaluation biologique de la Belgique. Texte explicatif général*, Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, Brussels.
- Noirfalise, A. et Thill, A. (1958), 'Les chênaies de l'Ardenne centrale', *Bull. Inst. Agron. Str. Rech. Gembloux*, 26, pp. 362-376.
- Noirfalise, A. et Vanesse, R. (1976), 'Les landes à bruyère de l'Europe occidentale', *Conseil de l'Europe, Strasbourg*.
- Noirfalise, A. et Vanesse, R. (1977), 'La hêtraie naturelle à luzule blanche en Belgique (Luzulo-Fagetum)', *communication NS 13, Centre d'écologie forestière et rurale (IRSIA), Gembloux*, p. 27.
- Oberdorfer, E. (1953), 'Der europäische Auenwald', *Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutsch.*, 12, pp. 83-70.
- Oberdorfer, E. (1957), *Süddeutsche Pflanzengesellschaften*, G. Fischer, Jena.
- Oberdorfer, E. (1967), 'Systematische Übersicht der westdeutschen Phanerogamen- und Gefasskriptogamen-Gesellschaften', *Sonderdruck aus der Schriftenreihe für Vegetationskunde*, 2, pp. 7-62.
- Oberdorfer, E. (1990), *Pflanzensoziologische Exkursionsflora*, Eugen Ulmer GmbH, Stuttgart.
- Ochsenbein, G. (1984a), 'Sixième journée: 11 juillet 1983. Le massif du Hohneck. Dixième session extraordinaire Vosges-Alsace (6-13 juillet 1983)', *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 15, pp. 235-241.
- Ochsenbein, G. (1984b), 'Huitième journée: 13 juillet 1983. Vosges saônoises et Ballon d'Alsace. Dixième session extraordinaire Vosges-Alsace (6-13 juillet 1983)', *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 15, pp. 257-260.
- Ocana-García, M. (1958), 'Estudio fitosociológico de "La Gardiole" (Languedoc)', *SIGMA communication No 140, Anales del Instituto Botanico A. J. Cavanilles*, 16, pp. 3-120.
- Ozenda, P. (1975), 'Sur les étages de végétation dans les montagnes du bassin méditerranéen', *Docts. de Car. écol.*, 16, pp. 1-32.
- Ozenda, P. (1979), 'Sur la correspondance entre les hêtraies médioeuropéennes et les hêtraies atlantiques et subméditerranéennes', *Documents phytosociologiques, NS 4*, pp. 767- 782.
- Ozenda, P. (1981), 'Carte de la végétation de la France au 200 000e. Végétation des Alpes sud-occidentales. Notice détaillée des feuilles 60 : Gap, 61 : Larche, 67 : Digne, 68 : Nice, 75 : Antibes', *Centre national de la recherche scientifique, Paris*.
- Ozenda, P. (1982), *Les végétaux dans la biosphère*, Doin, Paris.
- Ozenda, P. (1983), 'La végétation de l'arc alpin', *Collection sauvegarde de la nature No 29, Conseil de l'Europe, Strasbourg*.
- Ozenda, P. (1985), *La végétation de la chaîne alpine*, Masson, Paris.
- Ozenda, P. et Wagner, H. (1975), 'Les séries de végétation de la chaîne alpine et leurs équivalences dans les autres systèmes phytogéographiques', *Docts. de Car. écol.*, 16, pp. 49-64.
- Ozenda, P., Noirfalise, A., Tomaselli, R. et Trautmann, W. (1979), 'Vegetation map of the Council of Europe Member States', *Conseil de l'Europe, Strasbourg*.
- Parent, G. H. (1973), 'Les sites "Jean Massart" du Bas Luxembourg', *Ardenne et Gaume monographie No 10*, pp. 3-111.
- Parent, G. H. (1986), 'Essai d'interprétation de la distribution de l'écologie et de la régression d'*Helichrysum arenarium* L. Moench dans la partie occidentale de son aire', *Lejeunia, NS 118*, pp. 1-28.

Parent, G. H. et Burny, J. (1981), 'Esquisse écologique de la réserve naturelle du Zwin (Knokke-Heist, Belgique). Evolution dynamique du peuplement végétal et relations entre l'avifaune et la végétation', *Nat. Belges*, 62, pp. 49-86 and pp. 201-231.

Peinado Lorca, M. et Rivas-Martinez, S. (eds) (1987), *La vegetacion de Espana*, Universidad de Alcalá de Henares.

Penas, A. et Diaz Gonzalez, T. E. (1985), 'Datos sobre la alianza *Corynephoru-Plantaginion radicatae* Rivas-Goday and Rivas-Martinez (1963) Nom. invers. Rivas-Martinez (1975) en el sector Orensano-Sanabriense', *Acta Botanica Malacitana*, 10, pp. 155-166.

Petit, J. et Ramaut, J. L. (1970), 'La montagne Saint-Pierre, sa faune et sa flore', *Naturalistes Belges*, 51, pp.395-426.

Petit, J. et Ramaut, J. L. (1985), 'Montagne Saint-Pierre, 1985. Un bilan des acquis floristiques et faunistiques récents', *Naturalistes Belges*, 66, pp. 129-161.

Pignatti, S. (1959), 'Développement du sol et de la végétation sur la plage de Camon (Languedoc)', *SIGMA communication No 152*, Instituto e orto Botanico dell'Universita di Napoli, Estr. da Delpinea, NS 1, pp. 69-98.

Polunin, O. et Walters, M. (1985), *A guide to the vegetation of Britain and Europe*, oxford University Press.

Rameau, J.-C., Mansion, D., Dumé, G., Timbal, J., Lecoite, A., Dupont, P. et Keller, R. (1989), *Flore forestière française. Guide écologique illustré. I. Plaines et collines*, Institut pour le développement forestier, Ministère de l'Agriculture et de la Forêt, Paris.

Rameau, J.-C. et Royer, J. M. (1974), 'Les -forêts acidiphiles du sud-est du bassin parisien', *Colloques phytosociologiques*, 3, pp. 19-340.

Rameau, J.-C. et Timbal, J. (1979), 'Les groupements forestiers de fond de vallon des plateaux calcaires de Loir-Taine', *Documents phytosociologiques*, NS 4, pp. 847-870.

Reisigl, H., Danesch, E. et O. (1980), *Mittelmeerflora*, 2. Auflage, Hallwag, Bern.

Renault, J. (1978), 'Etude écologique des forêts de la Haute-Sûre (grand-duché de Luxembourg)', communication NS 20, Centre d'écologie forestière et rurale (IRSIA), Gembloux.

Rey, P., Lascombes, G. et Dupias, G. (1963), *Recherches expérimentales et essai de synthèse biogéographique dans la région des Côteaux de Gascogne*, serv. Carte vég., CNRS.

Richard, J. L. (1974), 'Note préliminaire sur les forêts feuillues acidophiles de Suisse', *Colloques phytosociologiques*, 3, pp. 389-391.

Richard, L. et Pautou, G. (1983), *Végétation des Alpes du Nord et du Jura méridional. Notice détaillée des feuilles Grenoble et Annecy*, Editions du CNRS, Paris.

Rivas-Martinez, S. (1974), 'La vegetacion de la clase *Quercetea ilicis* en Espana y Portugal', *Anales Inst. Bot. A. I. Cavanilles*, 31, pp. 208-259.

Rivas-Martinez, S. (1974), 'Observaciones sobre la sintaxonomia de los bosques acidofilos europeos, datos sobre la *Quercetalia robori-petraeae* en la peninsula Ibérica', *Colloques phytosociologiques*, 3, pp. 255-258.

Rivas-Martinez, S. (1975a), 'Esquema sintaxonomico de la clase *luncetea maritimi* en Espana', *Colloques phytosociologiques*, 4, pp. 193- 196.

Rivas-Martinez, S. (1977a), 'Sur la syntaxonomie des pelouses thérophytiques de l'Europe occidentale', *Colloques phytosociologiques*, 6, pp. 55- 71.

Rivas-Martinez, S. (1977b), 'Datos sobre la vegetacion nitrofila espanola', *Acta Botanica Malacitana*, pp. 159-167.

Rivas-Martinez, S. (1979), 'Brezales y jarales de Europa occidental (Revision fitosociologica de las clases *Calluno-Ulicetea* y *Cisto-Lavanduletea*)', *Lazaroa*, 1, pp. 5-127.

Rivas-Martinez, S. (1981), 'Les étages bioclimatiques de la végétation de la péninsule Ibérique', *Actas 3 Congr. Optima. Anales Iard. Bot. Madrid*, 37, pp. 251-268.

Rivas-Martinez, S., Alcaraz, F., Belmonte, D., Canto, P. et Sanchez-Mata, D. (1984), 'Contribucion al conocimiento de la vegetacion de los saladares del sureste de la peninsula Ibérica (*Arthrocnemion glauci*)', *Documents phytosociologiques*, NS 8, pp. 335-558.

Rivas-Martinez, S. et Costa, M. (1984), 'Sinopsis sintaxonomica de la clase *Arthrocnemetea* Br. Bl. and R. Tx. 1943 en la peninsula Ibérica', *Documents phytosociologiques*, NS 8, pp. 15-27.

Rodwell, J. S. (ed.) (1991), *British plant communities. Vol. I, 'Woodlands and scrub'*, Cambridge University Press.

Rogister, J. E. (1978), *Contribution à la classification écologique des groupements forestiers dans la vallée de la Semois ardennaise, Station de recherches des eaux et forêts Groenendael-Hoeilaart (Belgique)*, Travaux No A 18, pp. 1-43.

Roisin, P. (1961), 'Reconnaitances phytosociologiques dans les hêtraies atlantiques', *Bull. Inst. Agr. et Stat. de Rech. Gembloux*, 29, pp. 356-385.

Roisin, P. (1962), 'Contribution à l'étude de la végétation forestière des confins occidentaux du Massif ardennais', *Bull. Inst. Agr. et Stat. Rech. Gembloux*, 30, pp. 387-457.

Roisin, P. et Thill, A. (1962), 'Les forêts feuillues de la Famenne méridionale', *Bull. Inst. Agron. et Stat. Rech. Gembloux*, 30, pp. 139-191.

Rougemont, G. M. de (1989), *A field guide to the crops of Britain and Europe*, Collins, London.

Royer, I. M. (1977), 'Les pelouses sèches à thérophytes de Bourgogne et de Champagne méridionale', *Colloques phytosociologiques*, 6, pp. 133-145.

Saintenoy-Simon, J. (1965), 'La végétation forestière condrusienne. Note 2 : Les principaux groupements forestiers du Condroz et des régions avoisinantes', *Nat. Belges*, 46, pp. 109-126.

Schaer, J.-P., Veyret, P., Favarger, Cl., Rougeot, P.-C., Hainard R. et Paccaud, O. (1972), *Guide du naturaliste dans les Alpes, Delachaux and Niestlé, Neuchâtel*.

Schumacker, R. (1973), 'Les landes, pelouses et prairies semi-naturelles des plateaux des Hautes Fagnes et d'Elsenborn. 1. Aspects floristiques, phytosociologiques et phytogéographiques', *Colloques phytosociologiques*, 2, pp. 13-36.

Schumacker, R. (1976), 'Bref aperçu des groupements végétaux des fonds de vallées inondables en Haute Ardenne orientale', *Colloques phytosociologiques*, 5, pp. 249-258.

Schumacker, R. (1978), 'Groupements du *Caricetum limosae* (Paul 1910) Osv. 1923, du *Rhinchosporium albae* Koch 1926, du *Caricetum lasiocarpae* Koch 1926 et à *Carex rostrata-Sphaerium apiculatum* en Haute Ardenne nord-orientale', *Colloques phytosociologiques*, 7, pp. 461-475.

Schumacker, R., Duvigneaud, J., Lambinon, J. et de Zuttere, Ph. (1977) "La végétation pionnière des rives exondées de l'étang de Thommen (province de Liège, Belgique). Notes phytosociologiques et floristiques", *Nat. Belges*, 58, pp. 286-294.

Schumacker, R. et Froment, A. (1971), 'Pour la conservation du massif forestier du Hohe Mark et des hautes vallées de la Schwalm et de ses affluents à Eisenborn', *Natura Mosana*, 24, pp. 56-69.

Simms, E. (1971), *Woodland birds*, Bloomsbury Books, London.

Sissingh, G. (1974), 'Forêts caducifoliées acidiphiles dans les Pays-Bas (*Quercion roburi-petraeae*)', *Colloques phytosociologiques*, 3, pp. 363-373.

Sissingh, G. (1976), 'Le *Cirsio-Molinietum* Sissingh et de Vries (1942) 1946 dans les Pays-Bas', *Colloques phytosociologiques*, 5, pp. 289-301.

Sougné, N. (1951), 'Essai d'une classification phytosociologique des prairies du Pays de Herve', Centre de Cartographie phytosociologique et Centre de recherches écologiques et phytosociologiques de Gembloux, communication No 18, *Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique*, 84, pp. 123-151.

Sougné, N. (1967), *Les forêts de la Lorraine belge*, Presses agronomiques de Gembloux, Gembloux.

Sougné, N. (1973), 'La chênaie mélangée à bistorte de l'Ardenne (*Polygono bistortae-Quercetum roboris*)', *Bull. lard. Bot. Nat. de Belgique*, 43, pp. 37-82.

Sougné, N. (1974), 'Les chênaies silicoles de Belgique', *Colloques phytosociologiques*, 3, pp. 183-249.

Sougné, N. (1977), 'Les associations de la nardaie en Belgique', communication du Centre d'écologie forestière et rurale, NS 15, pp. 1-35.

Sougné, N. (1978), 'Les chênaies-charmaies du district calcaire mosan', communication du Centre d'écologie forestière et rurale, NS 23, pp. 1-85.

Sougné, N. et Limbourg, P. (1963), 'Les herbages de la Famenne et de la Fagne', *Bulletin de l'Institut Agronomique et des Stations de Recherches de Gembloux*, 31, pp. 359-413.

Stieperaere, H. (1973), 'Le *Violion caninae* au sud de Bruges', *Colloques phytosociologiques*, 2, pp. 157-160.

Sut ter, R. (1973), 'Über Vorkommen und Verbreitung von *Asplenium petrarchae* (Guérin) DC. und die Assoziationen *Phagnalo-Asplenietum petrarchae* Br.-Bl. und *Parietarium lusitanicae* ass. nov. prov. " SIGMA communication No 206, *Bot. lard. Syst.*, 93, pp. 568-602.

Sut ter, R. (1977), 'Über Vorkommen und Verbreitung von *Ferula glauca* DC. (*Ferula nodiflora* L. ss *monspeliensis* Godr. et Gren.) im Nieder-Languedoc (Frankreich)', *SIGMA communication No 218, Phytocoenologia*, 4, pp. 242-257.

Sut ter, R. (1978), 'Sind die *Centaurea rhapontica*- und die *Delphinium elatum*-Hochstaudenfluren Assoziationen? Ein Beitrag zur Kenntnis der *Adenostuletalia* in den Alpen', *SIGMA communication No 225, Commun. Soc. stud. veget. Alp. orient.*, 14, pp. 375-385.

Tanghe, M. (1964a), 'Contribution à l'étude de la végétation forestière de la Haute-Belgique. Note 1 : La chênaie-érablière eutrophe à caractère montagnard des versants froids de l'Ardenne occidentale', *Bull. Soc. Roy. Bot. de Belgique*, 97, pp. 37-58.

Tanghe, M. (1964b), 'Contribution à l'étude de la végétation forestière de la Haute-Belgique. Note 2 : Utilisation d'un transect topographique des environs de Muno pour la détermination des groupes écologiques forestiers de la Gaume et de l'Ardenne', *Bull. Soc. Roy. Bot. de Belgique*, 98, pp. 1-22.

Tanghe, M. (1967), 'Les groupes écologiques forestiers de la Gaume', *Lejeunia*, 43, pp. 1-65.

Tanghe, M. (1968, 1970), 'La végétation forestière de la vallée de la Semois ardennaise', *Bull. Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique*, 44, 8, pp. 1-55; 46, 16, pp. 1-60; 46, 30, pp. 1-76.

Terrisse, A. (1983), 'Neuvième session extraordinaire SBCO : Causses. Deuxième journée: mardi 6 juillet: le Larzac sud et ses annexes orientales', *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS 14, pp. 86-95.

Thil1, A. (1970), *Lefrène et sa culture. Mémoires 8*, Presses agronomiques de Gembloux, Gembloux.

Thil1, A., Dethioux, M. et Delecour, F. (1988), *Typologie et potentialités forestières des hêtraies naturelles de l'Ardenne centrale*, Institut pour l'Encouragement de la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture (IRSIA), Brussels.

Thil1, A. et Palm, R. (1979), 'Etude dendrométrique des chênes indigènes (*Quercus robur* L. et *Quercus petraea* (Mattuschka) Lieblein)', *Bull. Rech. Agron. Gembloux*, 14, pp. 267-284.

Timbal, J. (1974), 'Les rapports du *Luzulo-Fagion* et du *Quercion roburi-petraeae* dans le nord-est de la France', *Colloques phytosociologiques*, 3, pp. 341-361.

Timbal, J. (1981), 'Typologie des hêtraies', in: du Cros, Teissier (ed.), *Le Hêtre*, INRA, Paris. 215

Tomaselli, R. (1981a), 'Main physionomic types and geographic distribution of shrub systems related to Mediterranean climates' in: di Castri et al. (eds), *Ecosystems of the world 2. Mediterranean-type shrublands*, Elsevier, Amsterdam.

Tomaselli, R. (1981b), 'Relations with other ecosystems, temperate evergreen forests, savannahs, steppes and desert shrublands', in: di Castri et al. (eds), *Ecosystems of the world 2. Mediterranean-type shrublands*, Elsevier, Amsterdam.

- Tombal, P. (1974), 'Diagnose phytocoenologique des forêts proclimaciques acidiphiles de la région de Paris', *Colloques phytosociologiques*, pp. 301-304.
- Tutin, T. G. (1980), 'Zosteraceae' in: Tutin et al. (eds), *Flora europaea*. Vol. 5, Cambridge University Press.
- Tüxen, R. (1963), *Bericht über das Internationale Symposium für Vegetationskartierung, 23-26 March 1959 in Stolzenau, Weser, International Society for Plant Geography and Ecology, Verlag J. Cramer, Weinheim.*
- Vanden Berghen, C. (1951), 'Landes tourbeuses et tourbières bombées à sphaignes de Belgique', *Bull. Soc. Royale de Belgique*, 84, pp. 157-226..
- Vanden Berghen, C. (1953), 'Contribution à l'étude des groupements végétaux notés dans la vallée de l'Ourthe en amont de Laroche-en-Ardenne', *Bull. Soc. Royale Bot. Belg.*, 83, pp. 195-276.
- Vanden Berghen, C. (1963), 'Etude sur la végétation des Grands Causses du Massif central de France', *Mém. Soc. Royale Bot. Belgique*, I, pp. 1-285.
- Vanden Berghen, C. (1964), 'La végétation terrestre du littoral de l'Europe occidentale', *Nat. Belges*, 45, pp. 128-129.
- Vanden Berghen, C. (1969), 'Les forêts de la Haute-Soule (Basses-pyrénées)', *Bull. Soc. Royale Bot. Belg.*, 102, pp. 107-132.
- Vanden Berghen, C. (1975), 'La végétation du Boulonnais', *Nat. Belges*, 56, pp. 205-237.
- Vanden Berghen, C. (1982), 'Initiation à l'étude de la végétation', troisième édition, *Jardin Botanique National de Belgique, Meise.*
- Vanden Berghen, C. et Coûteaux, M. (1955), 'Contribution à l'étude de la végétation et de la flore du district lorrain. 3. Note sur la végétation forestière du district lorrain', *Bull. Soc. Royale Bot. Belg.*, 87, pp. 231-240.
- Vanden Berghen, C. et Mullenders, W. (1957), 'Etude sur les groupements végétaux des environs de Champlitte (plateau de Langre)', *Bull. Soc. Royale Bot. Belgique*, 90, pp. 73-102.
- Verrier, J.-L. (1982), 'Observations phytosociologiques sur les serres à *Genista cinerea* du Quercy Blanc', *Colloques phytosociologiques*, II, pp. 629-639.
- Wattez, J.-R. (1976), 'Les jonçaias acidoclines à *Juncus acutifloris* Ehr. du nord de la France', *Colloques phytosociologiques*, 5, pp. 319-338.
- Wattez, J.-R. (1977), 'Groupements sabulicoles pionniers des carrières de la partie occidentale du nord de la France (Thero-Airion, *Panico-Setarion*, *Spergulo-Erodion*)', *Colloques phytosociologiques*, 6, pp. 283-317.
- Way, J. M. et Greig-Smith, P. W. (1987), *Field margins*, BCPC Monograph No 35, British Crop Protection Council, Thornton Heath.
- Webb, N. (1986), *Seathlands*, Collins New Naturalist, London.
- Westhoff, V. et den Held, A. J. (1975), *Plantengemeenschappen in Nederland*, B.V.W.J. Thieme, Zutphen.
- Willems, J. H., Van Pruissen, A. M. F. C. et Van Sambeek, M. J. P. W. (1975), 'Scheuchzeria palustris L. in 1974 gevonden in de oostelijke Belgische Kempen " Dumortiera, 3, pp. 1- 7.
- Wolff, C. (1987), , *Analyse de la végétation aquatique et de la végétation riveraine de la Haute-Sûre en fonction de perturbations du milieu*', *Bull. Soc. Nat. Lu.xemb.*, 87, pp. 1-52.
- Wolkinger, F. et Plank, S. (1981), *Dry grasslands of Europe. Nature and environment series 21*, Conseil de l'Europe, Strasbourg.
- Wood, E. (1988), *Sea life of Britain and Ireland*, Immel, London.
- Wyatt, B. K., Cabot, D., ten Houte de Lange, S., Koeppel, H., Pinborg, U., de Beaufort, F. et Ribaut, J. P. (1982), 'Biotopes of significance for nature conservation', unpublished report, Commission of the European Communities, Brussels.
- Yon, D. et Tendron, G. (1981), *Les forêts alluviales en Europe. Elément du patrimoine naturel international*, Conseil de l'Europe, Strasbourg.
- Zarzycki, K. (1961), 'Etude sur la végétation des dunes anciennes en Petite Camargue', *SIGMA communication No 158, Acta Societatis Botanicorum Poloniae*, 30, pp. 377-610.